

Avertissements agricoles



Bulletin n° 26 du 23 octobre 1987


Numérotation continue : n° 54

COLZA :

- . Altises : arrêt des traitements
- . Charançon du bourgeon terminal : premières captures
- . Mouche du chou : quelques dégâts

CEREALES :

- . Pucerons : situation

ENQUETE TELEMATIQUE**COLZA :****- Charançon du bourgeon terminal :**

Développement des
larves (une tête
noire) dans le cœur
des plantes

Le traitement vise les adultes et doit intervenir avant le dépôt des oeufs, ce qui correspond environ à 10-15 jours après les premières captures.

. Préconisation : Une intervention doit être réalisée dans le secteur de VAUCOULEURS (RIGNY) à partir du 26 octobre, des captures ayant été enregistrées en milieu de mois. Dans les autres secteurs, surveillez vos cuvettes.

- Mouche du chou :

Larve de mouche du
chou (pas de tête
noire)

Les dégâts sont visibles actuellement au niveau des pivots, en particulier sur des parcelles semées tôt (mi août).

Nous vous rappelons qu'aucun moyen de lutte n'existe à ce stade du colza. Seul un traitement du sol au moment du semis reste la meilleure technique à ce jour.



CEREALES :

. Situation :

La majorité des orges sont au stade 2 à 3 feuilles, les plus avancées commencent à taller.

Les premiers semis de blés sont au stade 2 feuilles.

Les **pucerons**, susceptibles de transmettre le virus de la jaunisse nanisante sont encore peu nombreux. Les dernières observations montrent que la moitié des parcelles sont indemnes. Dans les emblavements actuellement infestés, on ne dénombre que 1 à 5 % de pieds porteurs de pucerons.

	LIEU	14/10		16/10		20/10		21/10	
		(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
55	RIGNY LA SALLE	2	1	2	0	2 à 3	0		
	BAUDIGNECOURT	1 à 2	1			2	0		
	TREVERAY					1 t	5		
	HEVILLIERS	2	0						
	VILLERS LE SEC					3	1		
	LE BOUCHON/SAULX					2 à 3	0		
	ANCERVILLE					2	2		
54	MAMEY							2	0
	FLIREY							3	0
	MOINEVILLE	2	0					3	4
	SAINT FIRMIN	2	0						
57	OTTANGE	1						1 t	3
	TRESSANGE							2	0
88	MARAINVILLE	2	0						

(1) : Stade des orges (nombre de feuilles) - t : talle

(2) : % pieds porteurs de 1 ou plusieurs pucerons

. Préconisations :

On peut encore attendre pour intervenir. Les températures douces actuelles étant plutôt favorables au développement des pucerons, continuer à surveiller les parcelles les plus exposées :

- semis du 15-20 septembre, actuellement au stade 3 feuilles à tallage
- parcelles abritées : proximité de forêts, bordures de haie, fond de vallée...
- abondance de maïs ou repousses d'orge à proximité du champ.

Si un changement devait intervenir avant la parution de notre prochain bulletin, un message serait enregistré sur notre répondeur téléphonique : n° : **83-37-45-98** et sur minitel (serveur CLOTAIR).

QUE PENSEZ-VOUS DE LA TELEMATIQUE AGRICOLE ?

DITES-LE A VOTRE MINTEL !

Le groupe des Fournisseurs de Services télématiques agricoles lance, avec l'appui de l'ANDA, une grande enquête par vidéo-questionnaire pour améliorer la qualité des programmes destinés aux agriculteurs et techniciens.

VOTRE AVIS LES INTERESSE

Répondez vite. Si vous êtes parmi les 300 premiers à répondre, un cadeau surprise vous est réservé.

Merci de votre collaboration

Comment répondre à ce vidéo-questionnaire ?

- 1 - Téléphone : 36-13 (0,13 F/mn)
 - 2 - Minitel : code GSI + envoi
 - 3 - Après connexion : AGRI + envoi
- L'enquête, ouverte le 26/10/87 sera close sans préavis